

## İTAKİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ

Doküman Kodu:HB.FR.018

Yayın Tarihi:24.11.2012

Rev.no:01

Revizyon tarihi:06.04.2022

Sayfa No:1/1

Tarih:						Yaşı :								
Hastanın Adı Soyadı:						Yattığı Bölüm:								
Cinsiyeti:						Risk Değerlendirme Tarihi:								
Değerlendirme Gerekçesi ve Numarası	1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği			5	Durum Değişikliği		
Parametreler	Risk Faktörleri						Puan	İlk Değerlendirme	Yeniden Değerlendirme (Tarih- Gerekçe Numarası)					
								( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
YAŞ	60-69						1	1	1	1	1	1	1	1
	70-79						2	2	2	2	2	2	2	2
	80 ve üstü						3	3	3	3	3	3	3	3
BİLİNÇ DURUMU	Bilinci kapalı.						1	1	1	1	1	1	1	1
	Bilinç bozukluğu var (Konfüze, laterjik vb.)						2	2	2	2	2	2	2	2
DÜŞME HİKAYESİ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.						3	3	3	3	3	3	3	3
HASTALIKLAR/KOMORBİDİTELER (Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler hastalık, parkinson hastalığı, uzun kaybı, nöbet, artrit, osteoporoz, kırıklar)	Hastalıklardan en fazla ikisi bulunmaktadır.						1	1	1	1	1	1	1	1
	Hastalıklardan 3 ve daha fazlası bulunmaktadır.						2	2	2	2	2	2	2	2
HAREKET KABİLİYETİ	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.						5	5	5	5	5	5	5	5
	Ayakta/yürürken denge bozukluğu var.						10	10	10	10	10	10	10	10
	Baş dönmesi var.						2	2	2	2	2	2	2	2
BOŞALTIM İHTİYACI	Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var.						1	1	1	1	1	1	1	1
GÖRME DURUMU	Görme bozukluğu var (Katarakt, gözlük kullanımı vb.)						2	2	2	2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.						10	10	10	10	10	10	10	10
İLAÇ KULLANIMI	4'den fazla ilaç kullanımı var.						2	2	2	2	2	2	2	2
	Son 1 hafta içinde riskli en çok 2 ilaç kullanımı var.						2	2	2	2	2	2	2	2
	Son 1 hafta içinde riskli 3 ve daha fazla ilaç kullanımı var.						3	3	3	3	3	3	3	3
EKİPMAN KULLANIMI (Hastanın hareketini kısıtlayan herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley katater, göğüs tüpü vb.)	Hastaya bağlı 1-2 bakım ekipmanı var.						1	1	1	1	1	1	1	1
	Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var.						2	2	2	2	2	2	2	2
<b>TOPLAM</b>														
Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı: İmza														

### RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU

Düşük Risk	0-9 Puan Arasında
Yüksek Risk	10 Puan Üzerinde

### NOT:

- \* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.
- \* İtakî Düşme Riski Ölçeği yalnızca yetişkin yatan hastalarda kullanılır.
- \* Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmaktadır.