

1.AMAÇ:

Hastane çalışanlarını kan ve vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak.

2.UYGULAMA:

2.1 Hava yolu ile bulaşan (açık akciğer tüberkülozu, larenks tüberkülozu, kızamık, suçiçeği gibi) enfeksiyonlardan korunmada partiküllerin %95'ini filtre edebilme özelliğine sahip (N95 veya FFP 3 tipi) maske kullanılmalıdır.

2.2 Maske takılırken; Burnu, ağız ve çeneyi tamamen içine almalıdır, yüze uygunluk tam olmalıdır

2.3 N-95 veya FFP3 maskesi kişiye özel olmalıdır, açıkta asılı tutmak ve dış yüzeyine temas etmemek kaydı ile sekiz saatlik bir shift boyunca tekrar kullanılabilir.

2.4 Damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyonlardan korunmada hastaya 1 metreden daha yakın mesafeden müdahale gereken durumlarda cerrahi maske kullanılmalıdır.

2.5 Hastanın sekresyonları ile bulaş ihtimali olduğunda cerrahi tipte maske kullanılmalıdır

2.6 Maske ıslandığında değiştirilmelidir

2.7 Gözlük hasta sekresyonları sıçrama ihtimali olan hallerde kullanılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı	Başhekim